



SensOff Topical Anesthetic Gel 20% Benzocaine Oral Anesthetic

EN Instructions for Use

INTRODUCTION:

Sense-Off is a fast-acting topical anesthetic gel containing 20% benzocaine in a water-soluble base, flavored for patient comfort. This product is designed to provide temporary numbness to accessible oral mucous membranes prior to dental procedures.

INTENDED USE:

SensOff is indicated for the temporary relief of occasional minor irritation and pain associated with:

- Local anesthetic injections
- Scaling

- Canker sore
- Minor dental procedures
- Minor injury of the mouth and gums
- Minor irritation of the mouth and gums caused by dentures and orthodontic appliances
- Other dental procedures requiring superficial anesthesia

COMPOSITION:

Benzocaine, thickening agent, flavor

DIRECTIONS FOR USE:

1- Apply a small amount (as needed) directly to the treatment area using a cotton swab or applicator.

2- Spread thinly and evenly.

Onset of action: 30 to 60 seconds

Duration of action: 5 to 15 minutes

WARNINGS:

- **Very important warning:** Risk of methemoglobinemia

Products containing benzocaine may cause methemoglobinemia, a serious condition that requires immediate treatment. Symptoms include: pale, grayish or bluish discoloration of the skin, lips, and nail beds; shortness of breath, fatigue, confusion, headache, dizziness, rapid heart rate. If any of these symptoms occur, discontinue use

immediately and seek emergency medical attention.

- Do not exceed the recommended dose.
 - Prolonged or excessive use may increase the risk of systemic absorption and methemoglobinemia.
 - Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with plenty of water.
 - Not for injection or ophthalmic use.
 - Use with caution in patients with severe liver disease, respiratory problems, or severely damaged mucosa.
 - Do not allow the product to be swallowed.
 - For use by dental professionals only.
 - Do not use after the expiration date printed on the package and label.
 - Do not use if packaging is damaged or if the product appears discolored or altered.
 - Keep out of reach of children.
- ### CONTRAINDICATIONS:
- **Allergy alert:** Do not use if patients have a history of allergy to local anesthetics such as procaine, butacaine, benzocaine or other "caine" anesthetics.
 - Contraindicated in children under 2 years of age.

DISPOSAL:

Dispose of unused product and empty containers in accordance with local regulations for medical waste.

PACKAGE CONTENTS:

- 1 Bottle of **SensOff** gel (30 g)
- Instructions for use

STORAGE:

Store in a cool, dry place (20–25°C), away from direct sunlight.

SHELF LIFE:

3 Years from the date of manufacturing.

For more information:
Visit www.molardm.com



IMD: 95987920



Tirooj Kimia Daroo Co.
Science and Technology Park of Kurdistan,
Sanandaj, Iran.
Call at (98) 8733742603
Info@molardm.com

F72300RD19 R00



سنس آف

ژل بی حسی موضعی

بی حسی دهانی بنزوکائین ۲۰٪

FA

دستورالعمل استفاده

معرفی:

سنس آف، یک ژل بی حسی کننده موضعی سریع الاثر حاوی ۲۰٪ بنزوکائین در پایه محلول در آب و طعم دهنده است. این محصول برای ایجاد بی حسی موقت در غشاهای مخاطی قابل دسترس دهان قبل از اقدامات دندانپزشکی طراحی شده است.

کاربرد:

سنس آف برای تسکین موقت تحریک و درد جزئی و گاه به گاه ناشی از موارد زیر تجویز می شود:

- تزریق بی حسی موضعی
- جرم گیری دندان
- آفت دهان

- مداخله (اقدامات) دندانپزشکی جزئی

- آسیب های جزئی دهان و لثه ها

- تحریک جزئی دهان و لثه ها ناشی از دندان مصنوعی و وسایل ارتودنسی

- سایر اقدامات دندانپزشکی که نیاز به بی حسی سطحی دارند.

ترکیبات:

بنزوکائین، غلظت دهنده، طعم دهنده

دستورالعمل استفاده:

۱- مقدار کمی (به اندازه لازم) از ژل را مستقیماً روی ناحیه درمان با سوآپ پنبه ای یا اپلیکاتور بمالید.

۲- به صورت نازک و یکنواخت پخش کنید.

شروع اثر: ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

مدت اثر: ۵ تا ۱۵ دقیقه

هشدارها:

- هشدار بسیار مهم: خطر متهموگلوبینمی

محصولات حاوی بنزوکائین ممکن است باعث متهموگلوبینمی شوند؛ وضعیتی جدی که نیاز به درمان فوری دارد. علائم شامل:

رنگ پریدگی، خاکستری یا آبی شدن پوست، لب ها و بستر ناخن؛ تنگی نفس، خستگی، گیجی، سردرد، سرگیجه، افزایش ضربان قلب.

در صورت بروز هر یک از این علائم، مصرف را فوراً قطع کنید و به اورژانس پزشکی مراجعه نمایید.

- از دوز توصیه شده تجاوز نکنید.

- استفاده طولانی مدت یا بیش از حد ممکن است خطر جذب سیستمیک و متهموگلوبینمی را افزایش دهد.

- از تماس با چشم خودداری شود. در صورت تماس، فوراً با آب فراوان شستشو دهید.

- برای تزریق یا استفاده چشمی نیست.

- در بیماران مبتلا به بیماری شدید کبدی، مشکلات تنفسی یا مخاط شدیداً آسیب دیده با احتیاط مصرف شود.

- اجازه ندهید محصول بلعیده شود.

- برای استفاده توسط متخصص دندانپزشکی در نظر گرفته شده است.

- پس از تاریخ انقضای چاپ شده روی بسته بندی و برچسب، استفاده نشود.

- اگر بسته بندی آسیب دیده باشد یا محصول تغییر رنگ داده یا تغییر یافته به نظر برسد، از آن استفاده نکنید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف:

- هشدار حساسیت: اگر بیمار سابقه حساسیت به بی حسی کننده های موضعی مانند پروکائین، بوتاکائین، بنزوکائین یا سایر بی حسی کننده های «کائین» دارد، استفاده نشود.

- استفاده از این محصول برای کودکان زیر ۲ سال سن ممنوع می باشد.

روش معدوم سازی:

محصول استفاده نشده و ظروف خالی را مطابق با مقررات محلی زباله های پزشکی معدوم کنید.

محتویات جعبه:

- یک بطری ژل سنس آف (۳۰ گرم)

- دستورالعمل استفاده






انبارش:





در جای خشک و خنک (۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

تاریخ انقضا:

۳ سال پس از تاریخ تولید.

برای اطلاعات بیشتر: به سایت www.molardm.com مراجعه شود.

	Expiry date تاریخ انقضا
	Manufacturer تولیدکننده
	Consult IFU استفاده بر اساس دستورالعمل
	Batch number شماره سری ساخت
	Limits of temperature of use and storage محدوده دمایی نگهداری و انبارش 20-25°C

	Caution: See instructions for use احتیاط: به دستورالعمل استفاده رجوع شود
	Product code کد محصول
	Sale by or on the order of a physician فروش با تجویز پزشک
	Irritant تحریک کننده چشم



شرکت تیروژ کیمیا دارو

پارک علم و فناوری کردستان، سنندج، ایران

شماره تماس: 08733742603